

12 ข้อควรรู้

พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560



1 ห้ามขาย / ให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ถ้าผู้ขาย / ผู้ให้ สงสัยอายุให้ขอดูบัตรประชาชน

โทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ




2 ห้ามใช้ จ้าง วาน ยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขาย / ให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



3 ห้ามผู้ขายปลีก



- (1) ขายโดยใช้เครื่องขาย
- (2) ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- (3) ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- (4) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
- (5) ขายโดยแสดงการลดราคา ณ จุดขาย
- (6) ขายสินค้า / ให้บริการโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- (7) เร่ขาย
- (8) ให้ / เสนอสิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือให้สิทธิประโยชน์อื่นเป็นการตอบแทน
- (9) แสดงราคา ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

...โทษ...

- ข้อ 1 - 3 : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ข้อ 4 - 6, 8 - 9 : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ข้อ 7 : ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

4 ห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่าง เพื่อให้แพร่หลาย / จูงใจให้บริโภค

โทษ : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท



5 ห้ามขายในสถานที่

- (1) วัดหรือสถานที่ทางศาสนา
- (2) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล ร้านขายยา
- (3) สถานศึกษา
- (4) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก



โทษ : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

6 ห้ามโฆษณา ทำการสื่อสาร การตลาด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ



โทษ : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

* ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้รับทำการโฆษณา หรือ ผู้ทำการสื่อสารการตลาด จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7 ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อขาย หรือเพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไป โฆษณา หรือทำการสื่อสารการตลาด สิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ / หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โทษ : ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ห้ามขายสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ / หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โทษ : ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

8 ห้ามผู้ขายปลีกแสดง / ยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก

โทษ : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท



9 ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีได้จัดให้มีหีบห่อ หรือแสดง เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความ ตามที่กฎหมายกำหนด

โทษ : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท



ห้ามผู้ใดผลิต / นำเข้าเพื่อขายบุหรี่ ชิกาแรตที่ต่ำกว่า 20 มวนต่อซอง

โทษ : ปรับไม่เกิน 300,000 บาท

11 ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขายส่ง และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนบุคคล หรือหน่วยงาน ในลักษณะ

- (1) สร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า
- (2) แทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- (3) โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า
- (4) ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ

...โทษ...

ผู้ประกอบการ / ผู้รับจ้าง : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ ในการดำเนินกิจกรรม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้เผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร : ปรับไม่เกิน 500,000 บาท



12 ให้เจ้าของสถานที่มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่

โทษ : ปรับไม่เกิน 3,000 บาท



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
โทร. 0-2590-3318
www.facebook.com/LawcenterDDC/



นิโคติน มีผลเสียต่อ เด็กในครรภ์



นิโคตินทำให้เส้นเลือดที่เลี้ยงรก
หดตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงทารกน้อยลง ประกอบกับ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันบุหรี่ ทำให้เลือดส่ง
ออกซิเจนได้น้อยลง และสารพิษอื่นๆ จากควันบุหรี่
เช่น โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม

- ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงรก
เกิดความผิดปกติ
- ทำให้ทารกได้รับเลือดและออกซิเจนน้อยลง
- ทำให้น้ำหนักตัวทารกน้อยลง มีความผิดปกติ
ในโครงสร้าง
- การทำงานของสมองทารก



นิโคติน อันตรายต่อ ทารกแรกเกิด



ในการทดลองที่ทำให้หนูที่ตั้งครรภ์ได้รับนิโคติน ทำให้
เกิดความผิดปกติของสมองของลูกหนูที่คลอดออกมา
มีพฤติกรรมที่ผิดปกติและทนต่อการขาดออกซิเจน
ได้น้อย **ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในทารกที่เสียชีวิต
กะทันหันในแม่ที่สูบบุหรี่ (Sudden Infant Death
Syndrome)**

นิโคติน เป็นสารที่มีอำนาจเสพติดรุนแรง

กลไกและพฤติกรรมเสพติดนิโคติน
มีคุณลักษณะเหมือนกับการเสพติด
เฮโรอีน หรือโคเคน
การเสพติดนิโคตินจากการสูบบุหรี่
ไฟฟ้ารุนแรงกว่าการเสพติดนิโคติน
ในบุหรี่มวน
แม้แม่ที่ตั้งครรภ์ จำนวนมากที่เลิกสูบ
บุหรี่ไม่ได้

นิโคติน สารพิษที่เสพติดรุนแรง ในบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า



นอกจากอันตรายจากนิโคตินแล้ว
การสูบบุหรี่มวน หรือบุหรี่ไฟฟ้า
ยังมีสารเคมีพิษ โลหะหนัก
และสารก่อมะเร็งจำนวนมาก
ที่ร่างกายจะได้รับด้วย




มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)
36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-1828 โทรสาร. 0-2278-1830 E-mail : info@ashthailand.or.th
www.ashthailand.or.th และ www.smokefreezone.or.th เผยแพร่เดือนมีนาคม 2567




บุหรี่ไฟฟ้า
หยุด
โทษทุกไม้อ่าง





นิโคติน ทำให้หัวใจ ทำงานหนักขึ้น

นิโคตินทำให้ร่างกายหลั่งสารเคมี Catecholamines ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น โดยทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันเลือดสูง และหัวใจบีบตัวแรงขึ้น ทำให้หัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น



นิโคติน ทำให้เลือดไปเลี้ยง หัวใจลดลง

นิโคตินทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพิ่มขึ้น แม้ในภาวะที่หัวใจต้องการ

เลือดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในคนที่หลอดเลือดแข็งตัวจากโรคความดันสูง หรือจากการสูบบุหรี่

นิโคติน ทำให้ความดันสูงขึ้น

ในคนที่เป็นโรคความดันสูง นิโคตินจะทำให้ความดันยิ่งเพิ่มขึ้น หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้ยาแรงขึ้น ในการรักษาความดัน




นิโคติน ส่งผลกระทบต่อไขมันในเลือด

การสูบบุหรี่ทำให้ระดับไขมันชนิดไม่ดี (VLDL และ LDL) ในเลือดเพิ่มขึ้น และไขมันชนิดดี (HDL) ลดลง นิโคตินทำให้สาร Catecholamines หลั่งออกมาเพิ่มขึ้น ทำให้ไขมันในเลือดเปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้หลอดเลือดแข็งตัว และเสื่อมเร็ว

นิโคติน ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ในกระเพาะอาหาร


การสูบบุหรี่ทำให้อาการกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ทำให้แผลหายช้า หรือกลับเป็นใหม่ ทั้งสองโรคนี้ เกิดจากการที่นิโคตินทำให้น้ำย่อยจากถุงน้ำดีไหลย้อนเข้าสู่กระเพาะ และการหลั่งสารที่เป็นต่างลดลง



นิโคติน ทำให้แผลหายช้า

การสูบบุหรี่ทำให้แผลผิวหนังหายช้า จากการที่นิโคตินทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงผิวหนังหดตัว

ทำให้ผิวหนังได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยลง แผลผ่าตัดก็หายช้า ซึ่งการหายของบาดแผลต้องการเลือดมาเลี้ยงที่เพียงพอ การปลูกผิวหนังในศัลยกรรมตกแต่ง ก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือได้ผลไม่ดี



นิโคติน กระตุ้นให้ เนื้องอก โตเร็วขึ้น

สารนิโคตินไม่ใช่สารก่อมะเร็ง แต่มีฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้นให้เนื้องอกโตเร็วขึ้น (Tumor promoter) สารก่อมะเร็งมีอยู่ในใบยาสูบตามธรรมชาติ และสารก่อมะเร็งจะเพิ่มขึ้น ในกระบวนการบ่มใบยา

